


GUÍA DE AVES

Parque Botánico Municipal
"Barón Carlos María Schuel"



Grupo Aves Jujuy



Editorial de la
Universidad
Nacional
de Jujuy

edunju

GUÍA DE AVES

**Parque Botánico Municipal
"Barón Carlos María Schuel"**

GUÍA DE AVES

**Parque Botánico Municipal
"Barón Carlos María Schuel"**

**Venecia Nuria Herrera
Sara Noemí Cabrera
María Verónica Tejerina
Nadia Alejandra Tejerina
Gloria Alejandra Yanina Romero
Héctor Rafael Portales**

**Grupo Aves Jujuy
Universidad Nacional de Jujuy
2024**

Prohibida la reproducción total o parcial del material contenido en esta publicación por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin permiso expreso del Editor.

Guía de aves : Parque Botánico Municipal Barón Carlos María Shuel / Venecia Nuria Herrera ... [et al.]. - 1a ed. - San Salvador de Jujuy : Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy - EDIUNJU, 2024.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga
ISBN 918-950-121-619-0

1. Biología. I. Herrera, Venecia Nuria
CDD 598.0982

Diseño de Tapa: Venecia Nuria Herrera

Diseño de Interior: Venecia Nuria Herrera, Gloria Alejandra Yanina Romero, María Verónica Tejerina, Sara Noemí Cabrera, Nadia Alejandra Tejerina

Corrección y cuidado de edición: Celia Navarro

Fotografías de tapa: María Verónica Tejerina, Gloria Alejandra Yanina Romero

© 2024 Venecia Nuria Herrera, Sara Noemí Cabrera, María Verónica Tejerina, Nadia Alejandra Tejerina, Gloria Alejandra Yanina Romero, Héctor Rafael Portales
E-mail: grupoavesjujuy.contacto@gmail.com

© 2024 Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy
Avda. Bolivia 1685 - CP 4600

San Salvador de Jujuy - Pcia. de Jujuy - Argentina
Tel. (0388) 4221511 - e-mail: editorial@unju.edu.ar

2024 1ra Edición

Queda hecho el depósito que previene la Ley 11.723
Impreso en Argentina - Printed in Argentina

ÍNDICE GENERAL

Agradecimientos	7
Prólogo	9
Presentación del Parque Botánico Municipal	11
Plano de los senderos del Parque Botánico Municipal	13
Topografía del ave	14
Interpretación de datos	15
Familia Tinamidae	17
Familia Cracidae	19
Familia Columbidae	21
Familia Cuculidae	26
Familia Nyctibiidae	30
Leyenda del Urutaú (pág. 32)	
Familia Apodidae	33
Familia Trochilidae	35
Familia Rallidae	39
Familia Charadriidae	41
Familia Ardeidae	46
Familia Threskiornithidae	45
Familia Cathartidae	50
Familia Accipitridae	54
Familia Alcedinidae	60
Familia Bucconidae	62
Familia Ramphastidae	64
Familia Picidae	66
Familia Falconidae	72
Familia Psittacidae	76
Familia Thamnophilidae	82
Familia Furnariidae	87
Leyenda del Hornero (pág. 93)	
Familia Tityridae	98
Familia Tyrannidae	101
Familia Vireonidae	117
Familia Corvidae	120
Familia Hirundinidae	122
Familia Troglodytidae	127
Familia Turdidae	130
Leyenda del Zorzal Colorado (pág. 133)	
Familia Passeridae	136
Familia Fringillidae	138
Familia Passerellidae	142
Familia Icteridae	148
Familia Parulidae	155
Familia Cardinalidae	162
Familia Thraupidae	166
Glosario	180
Bibliografía	186
Índice de nombres comunes	189
Índice de nombres científicos	196
Grupo Aves Jujuy	203
Sobre los autores	205





Tataupá Montaraz (*Crypturellus tataupa*)
Ph: Carlos Mariani

AGRADECIMIENTOS

Esta guía tomó alrededor de tres años de edición y recolección de datos, un trabajo en el que volcamos nuestro mayor esfuerzo, con el respaldo y el apoyo de muchas personas y entidades.

Queremos agradecer a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, al personal del Parque Botánico Municipal por abrirnos las puertas y por el apoyo a este proyecto. También a nuestro amigo Freddy Burgos, quien supo disipar nuestras dudas durante el proceso.

A nuestros amigos y colegas fotógrafos que aportaron su trabajo sin pensarlo dos veces: Jorge Schlemmer, Carlos Rosello, Carlos Mariani, Freddy Burgos, Sergio Moya, Marisel Morales, Emir Yanacón, Alejandra Sosa, Jorge La Grotteria, Gabriela Domínguez, Fabiana Sosa y Guadalupe Funes.

A todas las personas que dedicaron su tiempo y esfuerzo en los muestreos a campo, que permitieron obtener datos para la realización de ésta guía, en especial a Gabriela Domínguez y Fabiana Sosa, miembros del Grupo Aves Jujuy, que además colaboraron dedicadamente con las gestiones para su publicación.

A nuestra familia que nos acompañó y apoyó en esta hermosa tarea de conocer y descubrir nuestro querido Jujuy y su abundante avifauna.

A cada docente que inculcó en nosotros el amor hacia la naturaleza y el deber de cuidarla y divulgar la importancia de su protección y conservación a través de pequeñas y grandes acciones.

A cada observador/ra y/o fotógrafo/a de aves que hemos tenido el honor de conocer.



Yapú (*Psarocolius decumanus*)
Ph: Gabriela Domínguez

La Provincia de Jujuy se sube al podio de los estados con mayor número de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves. Los 27 sitios resaltados como valiosos para la biodiversidad local, abarcan algo más del 20% de la superficie de la "campanita de plata". Sin embargo, apenas 7 de ellos tienen una protección total. Incrementar el número de áreas protegidas para seguir amparando la Puna, las Yungas y el Chaco en esta provincia maravillosa, tiene que ser una política de estado, donde los privados y municipios jueguen también un rol clave.

Para avanzar en esa meta, la empatía con la naturaleza en general y las aves en particular es la clave. La observación de aves, la conservación de sitios urbanos y la educación ambiental son tres herramientas potentes que pueden hacer la diferencia.

Esos tres pilares están bien presentes en la Guía de Aves del Parque Botánico Municipal "Barón Carlos María Schuel" que, además, es una singular reserva natural urbana.

Cuando recorras sus páginas comprobarás que es, ante todo, una obra didáctica con textos esenciales donde las aves son protagonistas descollantes. Información sobre las familias y fotos de tamaño considerable para ayudar en ese acercamiento a las aves, datos curiosos y leyendas que sin duda te transmitirán las ganas de salir al campo a identificar, sorprenderte y maravillarte con estas 125 especies de las selvas montañas de esta provincia única.

Pero el trabajo está signado por un condimento más: el entusiasmo. Sus autoras y el autor, conformaron el Grupo Aves Jujuy, que en los textos iniciales se muestran de cuerpo entero y nos contagian su pasión y vocación naturalista y conservacionista.

Celebro también el acompañamiento del Municipio de San Salvador de Jujuy y de la Universidad Nacional de Jujuy a este aporte que interpreto inmenso considerando que su objetivo es motivarnos para acercarnos un poco más a la naturaleza. Es imprescindible.

Como canta Tomás Lipán... *"Me gusta Jujuy, mi Jujuy cuando aclara /y en los charcos mirarme la cara /y mirar los gorriones - y a estas 125 aves - al cielo volar..."*. Ahora, con la Guía de Aves del Parque Botánico Municipal "Barón Carlos María Schuel", esa mirada al cielo cobra nuevos sentidos y despierta los nuestros. Para que sigamos apostando a un futuro más natural para la fruta madura y el jazmín encendido del noroeste argentino.

Dr. Andrés Bosso
Aves Argentinas
Miembro de Honor de BirdLife International



Picaflor Cometa (*Sappho sparganurus*)
Ph: Venecia Herrera

PRESENTACIÓN DEL PARQUE BOTÁNICO MUNICIPAL "BARÓN SCHUEL"

El Parque Botánico Municipal "Barón Carlos María Schuel" es una Reserva Natural Urbana, situada en el barrio Los Perales en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Con una superficie de 15.5 hectáreas, se ubica entre los 1334 y los 1463 m.s.n.m., rango de altura que corresponde a la Selva Montaña de la ecorregión de las Yungas.

A través de una caminata autoguiada por senderos de tierra que conducen a distintos miradores, el visitante tendrá la posibilidad de observar la flora y la fauna nativas de la región, mientras disfruta de inolvidables paisajes.

Las aves son un atractivo indiscutible de la reserva. Siendo el hogar permanente o momentáneo de más de 100 especies, el Parque Botánico se muestra como un potencial punto de interés para los observadores de aves.

Además de actuar como un pulmón verde de la capital jujeña, representa un importante sitio de enseñanza donde se desarrollan tareas en temas de educación, conservación e investigación.



@pbmbaronschuel



@pbmbaronschuel



@parquebotanico



Puente "El Ceibo"
Ph: Guadalupe Funes

Plano de los senderos del Parque Botánico Municipal



© Verónica Tejerina

*CIRCUITO VIGENTE
HASTA EL AÑO 2023

Referencias:

Recorrido 2720 m en aprox. 2 hs.

-  Descanso
-  Mirador
-  Puente

1° Descanso "Mora Negra" 470m

1° Mirador "El Guarán" 655m

2° Descanso "Pucancho" 975m

3° Descanso "La Tusca" 1290m



2° Mirador "Sacha Higuera" 1440m

1° Puente "El Laurel" 1790m

2° Puente "El Ceibo" 2000m

3° Mirador "Horco Molle" 2345m

TOPOGRAFÍA DEL AVE



INTERPRETACIÓN DE DATOS

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Carpinterito Barrado *Picumnus cirratus*



♂ MACHO

♀ HEMBRA

J JUVENIL

M: Macho

H: Hembra

FOTÓGRAFO



9 cm. M: Frente roja. Cabeza negra con puntos blancos. Ventral barrado en toda su superficie. Dorso pardo grisáceo. H: Similar al macho pero sin frente roja.

Estrato: subdosel


Dh. Yanina Diabero

Dh. Yanina Diabero

DESCRIPCIÓN
Incluye tamaño, características principales y si presenta o no dimorfismo o dicromatismo sexual.



GRÁFICO



CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Aves Argentina) (2017)

● NA: No Amenazada

● AM: Amenazada

● VU: Vulnerable

PRESENCIA

E: Estacionaria

R: Residente

POSIBILIDAD DE OBSERVACIÓN

A: Alta

B: Baja

M: Media

ESTRATOS

(Lugar por donde el ave suele desplazarse)



Dosel

Subdosel

Sotobosque




Zona Urbanizada:
entrada y alrededores
del Parque.



En Vuelo: que
sobrevuelan la
Reserva.



Loro Alisero (*Amazona tucumana*)
Ph: Carlos Mariani

The background is a solid red color. Scattered across the entire surface are several white line-art outlines of feathers. The feathers vary in size and orientation, some pointing upwards, some downwards, and some horizontally. They are distributed across the page, with a higher density in the upper and lower portions.

Familia Tinamidae


Plumaje mimético.
Cabeza chica.
Alas cortas.
Patas cortas y fuertes.

Tataupá Montaraz *Crypturellus tataupa*




Ph: Emir Yanacon

23 cm. Cabeza y cuello gris plomo. Iris pardo. Pico naranja rosáceo. Garganta blanquecina. Pecho plumizo con tonos ocre pálido hacia ventral. Dorso castaño violáceo. Flancos y subcaudal con plumas negras ribeteadas en tonos beige. Patas gris rosáceas. Cola castaña.



Estrato: sotobosque



Familia Cracidae

Similares a pavos.
Plumajes generalmente oscuros.
Cola larga.

Pava de Monte Yungueña *Penelope bridgesi*




Ph: Yanina Romero

72 cm. **M (macho)**: Piel de la cara desnuda, gris oscuro. Iris rojo. Pico negrozco. En la garganta, una carúncula color rojo. Dorso, flancos y caudal pardos. Notable estriado blanco en corona, cuello, espalda y pecho. Patas gris rosáceas. Cola larga pardo oscura.



H (hembra): Similar al macho, con iris pardo.


Ph: Verónica Tejerina



Estrato: dosel, subdosel y sotobosque

Ph: Verónica Tejerina





Familia Columbidae

Palomas.

Generalmente de plumaje gris.

Robustas.

De cabeza chica.

Pico con cera en la base.

Cuello corto.

Patas cortas, a veces, de color rojizo.


Paloma Doméstica *Columba livia*



Ph: Verónica Tejerina

32 cm. Pico negro. Iris naranja. Coloración general gris azulado, con reflejos verdes violáceo en cuello y pecho. Dos bandas negras en las alas. Existe gran variación de colores y plumajes intermedios. Patas rosáceas.

Especie introducida.



Zona urbanizada

Ph: Verónica Tejerina




Paloma Picazuró *Patagioenas picazuro*



Ph: Venecia Herrera

35 cm. Iris anaranjado. Cabeza, cuello y pecho violáceo vinoso. Parte dorsal del cuello escamada de celeste brillante a cobrizo. Pico gris. Dorso y alas color pardo con plumas ribeteadas color beige. Bordes blancos en cobertoras alares. Patas rojizas. Cola plumiza con banda negra en el extremo distal.



Estrato: dosel y subdosel

Ph: Yanina Romero




Yerutí Gris *Leptotila verreauxi*



Ph: Yanina Romero

30 cm. Frente más pálida que el resto de la cabeza. Pico negro. Iris naranja amarillento. Cuello, ventral y subcaudal blanquecino rosáceo. Nuca y cuello dorsal celeste grisáceo. Dorso pardo grisáceo. Patas rosáceas. Cola pardo negruzca con banda blanca en el extremo distal.



Estrato: subdosel y sotobosque


Ph: Venecia Herrera



Yerutí Yungueña *Leptotila megalura*



Ph: Venecia Herrera




Estrato: subdosel y sotobosque

30 cm. Cabeza parda con mejillas más pálidas y frente grisácea. Pico negro. Iris pardo. Cuello y dorso superior violáceo tornasolado. Ventral ocráceo. Dorso grisáceo. Alas pardo oscuro. Subcaudal blanquecino. Cola dorsal grisáceo parduzco con ápice blanco, más blanquecina en el ventral. Patas rosáceas.

Ph: Freddy Burgos





Familia Cuculidae

Esbeltos.

Pico curvo.


Cola larga y escalonada.

Algunas especies con ápices
blancos en la cola.

Tingazú *Piaya cayana*



Ph: Yanina Romero




Estrato: dosel y subdosel

46 cm. Castaño pardusco en corona y dorsal del cuello. Pico curvo amarillo verdoso. Iris rojizo. Periorcular desnudo color rojo. Garganta y cuello canela pálido. Dorsal rufo intenso. Ventral gris. Cola larga rufa con ventral negro. Ápice blanco en timoneras.

Ph: Fabiana Sosa

Ph: Yanina Romero



Cuclillo Canela *Coccyzus melacoryphus*




Ph: Yanina Romero

27 cm. Cabeza gris ceniciento. Pico negro. Antifaz negruzco. Periocular amarillo oscuro. Dorsal pardo. Ventral amarillento, ocráceo hacia la garganta. Cola larga parda con ventral negruzco y ápices blancos en timoneras.

Migrante.

Ph: Venecia Herrera



Estrato: dosel
y subdosel


Ph: Fabiana Sosa



Cuclillo Pico Amarillo *Coccyzus americanus*



Ph: Yanina Romero



Estrato: dosel y subdosel


27 cm. Cabeza pardo grisáceo. Pico con culmen negro y maxila amarilla. Periocular amarillo. Garganta, pecho y ventral blancos. Dorsal pardo grisáceo. Mancha rufa en remeras primarias y secundarias. Cola larga, con plumas manchadas de blanco en el ápice, centrales pardas, externas negruzcas. Patas grises.

Migrante.

Ph: Yanina Romero

Ph: Yanina Romero





Familia Nyctibiidae


Plumaje mimético.
Vibras notables y largas.
Boca, cabeza y ojos grandes.

Urutaú *Nyctibius griseus*



Ph: Venecia Herrera


35 cm. Cabeza grande y enormes ojos amarillos. Pico negruzco. Pecho estriado canela. Plumaje manchado con distintas tonalidades de pardos y grises con máculas negras.



Estrato: dosel y subdosel




Ph: Venecia Herrera



Leyenda del Urutaú

Narra la leyenda, que en tiempos antiguos, vivían en lo que hoy es Santiago del Estero, dos hermanos, una mujer y un varón. La bondad del muchacho difería con la crueldad de su hermana. Cansado de su mala actitud, el joven la invitó a que lo acompañara a recoger miel al bosque. Fueron allí y cuando divisaron un enorme árbol, treparon juntos y sin que ella se diera cuenta, él comenzó a bajar desgajando el árbol, para que ella no pudiera descender. La muchacha quedó cautiva en las alturas y en la noche se escuchaban sus gritos: “Turay, turay! kakuy, kakuy!” que en quechua significa “hermano mío, muchacho mío”. Al pasar las horas sus manos se convirtieron en alas, sus pies en garras y su cuerpo se cubrió de plumas. Así nació el “Kakuy”, un ave nocturna que estremece con su canto.

Ph: Carlos Mariani
Fuente: Diario El Tribuno, 2020.



Familia Apodidae

Semejantes a golondrinas,
de mayor tamaño.
Alas largas, estrechas y curvas.
Patas muy cortas.


Vencejo de Collar *Streptoprocne zonaris*



Ph: Jorge Schlemmer

21 cm. Negro a pardo oscuro. Cabeza oscura. Notable collar blanco, completo. Cola ligeramente furcada. Silueta en vuelo en forma de boomerang.

Migrante.



En vuelo

Ph: Jorge Schlemmer





Familia Trochilidae

Plumaje vistoso, iridiscente.

Pico fino y largo, a veces, curvo.

Patas diminutas.

La mayoría de las especies presentan
dimorfismo sexual.

Picaflor Cometa *Sappho sparganurus*




Ph: Yanina Romero



M: 16 cm. Coloración general verde. Postocular y lagrimal blancos. Pico negro. Garganta negra. Espalda, lomo y rabadilla magenta iridiscente. Remeras negras. Ventral verde esmeralda. Muslos blancos. Patas negras. Cola generalmente larga, naranja brillante con tonalidades verdes y amarillos con ápices negros.

H: 12 cm. Similar al macho. Ventral blanco punteado de verde. Cola más corta.




Estrato: subdosel

Ph: Venecia Herrera

Picaflor Verde *Chlorostilbon lucidus*



Ph: Verónica Tejerina





Estrato: subdosel

9 cm. M: Pico color coral con ápice negro. Coloración general verde esmeralda con reflejos turquesas. Ventral azulado a bronceado hacia los flancos. Remeras negruzcas. Cola levemente furcada, dorsal azul y ventral completamente oscuro. Patas negras.

H: Frente parda. Fina ceja postocular blanca. Pico color coral con ápice negro. Garganta y ventral blancos, a veces, agrisados. Cola furcada con ápices blancos.

Ph: Yanina Romero

Ph: Sara Cabrera




Picaflor Vientre Blanco *Elliotomyias chionogaster*



Ph: Venecia Herrera

9 cm. Cabeza, dorso y cobertoras alares color verde bronceado. Postocular blanco. Pico negro, largo y algo curvo, con base de la mandíbula naranja. Garganta, vientre y subcaudal blancos. Cola furcada verde bronceado, con ápice apenas blanco. Patas negras.




Estrato: subdosel

Ph: Fabiana Sosa



Ph: Yanina Romero





Familia Rallidae

Alas cortas y redondas.
Patas fuertes.
Cola corta, a veces, erecta.
Dedos largos.


Chiricote *Aramides cajaneus*



Ph: Verónica Tejerina



37 cm. Cabeza, cuello, espalda y pecho grises. Frente gris. Corona castaña. Iris rojo. Pico verde con base amarilla. Ventral rufo. Dorso gris oliváceo. Subcaudal y cola negros. Patas rojo rosáceo.



Estrato: sotobosque y áreas abiertas

The background is a solid green color with several white line-art illustrations of feathers scattered across it. The feathers vary in size and orientation, some pointing upwards and others downwards.

Familia Charadriidae

Cabeza redondeada.
Patas largas o cortas.
Alas redondeadas con espolones.
Sin dimorfismo sexual.


Tero *Vanellus chilensis*



Ph: Yanina Romero



33 cm. Cabeza y cuello gris oscuro. Iris rojo. Penacho nucal largo y negro. Frente, gular y pecho negros. Dorso parduzco con brillos verdes y violetas. En vuelo, remeras y faja caudal negras.



Ph: Verónica Tejerina

The background is a solid green color with several white line-art feathers scattered across it. The feathers are of various sizes and orientations, some pointing upwards, some downwards, and some horizontally. They have a detailed structure with many fine lines representing barbs.

Familia Ardeidae


Tienen el pico, cuello y patas largos.
Alas grandes y anchas.
Sin dimorfismo sexual notable.

Chiflón *Syrigma sibilatrix*



Ph: Sara Cabrera

58 cm. Periorcular desnudo de color celeste. Corona grisácea hasta la base de los ojos, largas plumas nucales gris violáceo con puntas amarillentas. Pico rosáceo con ápice negro. Mejilla parda. Cuello y ventral amarillento pálido. Dorso gris ceniza con cubiertas alares acaneladas, ribeteadas de gris. Patas negruzcas.



En vuelo

Ph: Venecia Herrera




Garcita Blanca *Egretta thula*



Ph: Venecia Herrera

57 cm. Plumaje enteramente blanco. Iris amarillo. Pico fino color negro, loral amarillo. Patas negras con dedos amarillos.

Época reproductiva: Presenta largas plumas blancas en la cabeza, pecho y lomo, llamadas "egretes".



En vuelo



Ph: Verónica Tejerina

The background is a solid green color with several white line-art illustrations of feathers scattered across it. The feathers vary in size and orientation, some pointing upwards and others downwards.


Familia Threskiornithidae

Pico curvo o espatulado.
Patas y cuello largos.
Dedos no palmeados.
Alas largas y anchas.
Cuerpo alargado.

Cuervillo de Cañada *Plegadis chihi*



Ph: Verónica Tejerina



En vuelo


53 cm. Plumaje general negro parduzco con destellos tornasolados en azul y verde. Estrías blancas en cabeza y cuello. Iris rojo. Pico gris.

Época reproductiva: Color cobrizo, con una línea blanca bordeando el periocular sutilmente desnudo. Patas grises, que en vuelo sobresalen completamente de la cola.

Ph: Sara Cabrera



Ph: Verónica Tejerina




Cuervillo Cara Pelada *Phimosus infuscatus*



Ph: Venecia Herrera

54 cm. Plumaje completamente negro con brillos verdes azulados. Cara con frente y zona ocular desnuda color rosáceo. Pico marfil. Patas rosáceas, que en vuelo no sobrepasan la cola.




En vuelo

Ph: Venecia Herrera




Ph: Verónica Tejerina



Bandurria Boreal *Theristicus caudatus*



Ph: Jorge Schlemmer




En vuelo

73 cm. Corona rufa. Iris rojo. Periocular desnudo de color negro. Pico negro agrisado. Gular negro. Semicollar rufo. Cuello amarillo pálido. Vientre y abdomen negros. Espalda gris, con cobertoras alares medias e inferiores blancas. Patas rosáceas.

Ph: Venecia Herrera

Ph: Fabiana Sosa



The background is a solid teal color with several white line-art outlines of feathers scattered across it. The feathers vary in size and orientation, some pointing upwards and others downwards.


Familia Cathartidae

Narinas grandes.
Sin plumas en la cabeza.
Alas largas y anchas.
Patas robustas.
Cola larga y redondeada.
Sin dimorfismo sexual.

Jote Real *Sacoramphus papa*



Ph: Sergio Moya




En vuelo

78 cm. Cuello, nuca y parte de la corona desnudos de color rojo anaranjado. Carúncula anaranjada prominente sobre el pico, resto de la cabeza sin plumas, de color negro ahumado. Iris blanco y periocular desnudo rojo anaranjado. Collar gris. Plumaje general blanco. Primarias, secundarias y terciarias alares, cola y rabadilla negras. Patas grises.

Ph: Carlos Rossello

Ph: Nadia Tejerina




Jote Cabeza Negra *Coragyps atratus*



Ph: Gabriela Dominguez

57 cm. Cabeza y cuello desnudos de color gris oscuro. Plumaje general negro. Cola corta. Patas grises.

En vuelo: Alas anchas. En vista ventral se observan las puntas de las primarias de color blanco.




Estrato: dosel y en vuelo

Ph: Fabiana Sosa



Ph: Venecia Herrera




Jote Cabeza Colorada *Cathartes aura*




Ph: Yanina Romero

70 cm. Cabeza y cuello desnudos de color rojo rosáceo. La nuca puede ser pálida. Pico de base rojo rosáceo con punta marfil. Plumaje general negro parduzco.

En vuelo: Ventralmente primarias, secundarias y terciarias blanquecinas. Patas grises.



Estrato: dosel y en vuelo



Ph: Fabiana Sosa

Familia Accipitridae

Pico corto, curvo, sin borde dentado.

Excelente sentido de la visión.

Alas largas.


Patas y garras fuertes.

Con dimorfismo sexual, la hembra es de mayor tamaño que el macho.

Milano Tijereta *Elanoides forficatus*



Ph: Freddy Burgos




En vuelo

60 cm. Cabeza, cuello y ventral blancos. Iris amarillo dorado. Pico negro con cera gris. Dorso negro grisáceo. En vuelo: Ventral con tapadas blancas, en contraste con primarias, secundarias y terciarias negras. Cola negra ahorquillada. Subcaudal blanco.

Migrante.

Ph: Sara Cabrera

Ph: Nadia Tejerina



Esparvero Variado *Accipiter bicolor*




Ph: Jorge Schlemmer



M: 35 cm / H: 43 cm. Cabeza y dorso gris oscuro. Iris amarillo anaranjado. Pico negro con cera amarilla. Ventral gris claro con zonas acaneladas. Subcaudal blanco. Cola gris parduzca con cuatro bandas oscuras. Piernas rufas. Patas amarillas.

En vuelo: Remeras barradas de gris. Tapadas rufas.




Estrato: dosel y en vuelo

Ph: Nadia Tejerina

Taguató *Rupornis magnirostris*



Ph: Yanina Romero



Estrato: dosel y en vuelo

M: 34 cm / H: 41 cm. Capuchón y dorso pardo oscuro con cobertoras y primarias manchadas de rufo. Ventral crema con barrado canela. Iris amarillo. Pico negro. Cera y patas amarillas. Cola dorsalmente marrón rojizo con cuatro bandas oscuras. En vuelo: Alas ventralmente barradas de pardo, puntas de las primarias oscuras.

Ph: Nadia Tejerina



Ph: Gabriela Dominguez




Aguilucho Ñanco *Geranoaetus polyosoma*



Ph: Freddy Burgos

M: 44 cm / H: 55 cm. Presenta diferentes tipos de plumajes.
Morfo claro: Dorsal gris. Ventral blanco con fino barrado.
Cola blanca con banda apical negra.
M: espalda completamente gris. H: espalda rufa.



En vuelo

Ph: Verónica Tejerina



Ph: Verónica Tejerina




Aguilucho Cola Corta *Buteo brachyurus*



Ph: Sergio Moya

M: 36 cm / H: 40 cm. **Morfo claro:** Cabeza negra con frente y garganta blancas. Ventral blanco. Dorsal pardo oscuro, casi negro. Cola gris oscuro con cinco bandas negras. **Morfo oscuro:** Negro con tapadas internas negras y remeras claras.



En vuelo



Ph: Nadia Tejerina

Familia Alcedinidae

Pico recto, robusto, largo y agudo.

Cabeza grande con semicopete.

Alas cortas y redondeadas.


Coloridos.

Tres dedos hacia adelante (dos de ellos unidos)
y uno hacia atrás.

Martín Pescador Grande *Megaceryle torquata*



Ph: Fabiana Sosa



En vuelo

38 cm. M: Cabeza y dorso azul grisáceo. Corona eréctil. Cuello completamente blanco. Ventral rufo.

H: Similar al macho, con un collar pectoral ancho de color azul grisáceo y un segundo collar fino de color blanco.

Ph: Nadia Tejerina



Familia **Bucconidae**

Cabezones.

Pico grande, robusto, con vibrisas.

Patas cortas.

Dos dedos hacia adelante
y dos hacia atrás.


Cola corta.

Durmilí *Nystalus maculatus*



Ph: Verónica Tejerina

19 cm. Cabeza y dorso pardo, moteados de ocre. Iris amarillo. Ceja acanelada. Pico robusto bicolor, oscuro en la base y rojizo hacia el ápice. Garganta blanca. Cuello canela. Ventral blanco estriado de pardo y negro. Cola barrada de ocre.



Estrato: sotobosque




Familia Ramphastidae

Pico muy grande, colorido,
con bordes aserrados y muy ligero.
Lengua muy larga, angosta, aplanada
y termina en punta.
Alas cortas y redondeadas.
Patas cortas y fuertes.
Sin dimorfismo sexual.

Tucán Grande *Ramphastos toco*



Ph: Nadia Tejerina



Estrato: subdosel

55 cm. Plumaje general negro. Periocular turquesa. Zona alrededor del periocular desnuda amarillo anaranjado. Gran pico amarillo anaranjado con la base y punta negra. Babero de garganta a pecho blanco. Subcaudal rojo. Rabadilla blanca. Patas gris celestes.

Ph: Venecia Herrera



Ph: Yanina Romero





Familia Picidae

Pico fuerte, recto y agudo.
Lengua fina y puntiaguda, con
pequeñas cerdas.

Cola rígida, que usan para apoyarse.
Tienen cuatro dedos, dos hacia delante
y dos hacia atrás.


Algunas especies presentan
dicromatismo sexual.

Carpinterito Barrado *Picumnus cirratus*



♂

Ph: Yanina Romero




9 cm. M: Frente roja. Cabeza negra con puntos blancos. Ventral barrado en toda su superficie. Dorso pardo grisáceo. H: Similar al macho pero sin frente roja.


Estrato: subdosel

Ph: Venecia Herrera

Ph: Venecia Herrera



♀




J

Carpintero Oliva Yungueño *Dryobates frontalis*




Ph: Venecia Herrera

17 cm. M: Corona y nuca rojas. Frente pardo oscuro con puntos blancos. Ventral pardo oscuro con un barrado blancuzco. Dorsol oliva dorado. Cobertoras alares con punteado blanco disperso.
 H: Similar al macho, con la corona y nuca pardas, punteadas de blanco (sin rojo).




Estrato: subdosel

Ph: Yanina Romero



Ph: Nadia Tejerina




Carpintero Lomo Blanco *Campephilus leucopogon*



Ph: Nadia Tejerina

34 cm. M: Cabeza con copete erecto rojo intenso. Iris amarillo. Pico color marfil. Cuello rojo. Una línea blanca, corta en la mejilla y otra negra. Ventral totalmente negro. Dorsal negro con parche triangular color crema en la espalda.
H: Similar al macho, pero con antifaz y frente negra. Malar crema, sin líneas en las mejillas.



Estrato: subdosel



Ph: Verónica Tejerina

Carpintero Dorado Gris *Colaptes rubiginosus*




Ph: Nadia Tejerina

22 cm. M: Media corona y nuca rojas. Frente negro plumizo. Ancha faja ocular blanquecina. Malar rojo. Ventral blanco amarillento barrado de oscuro. Dorsal oliva dorado uniforme. Cola pardo oscuro.

H: Similar al macho, pero sin banda malar roja.

Ph: Venecia Herrera



Estrato: subdosel



Carpintero Real *Colaptes melanochloros*




♂

Ph: Fabiana Sosa

25 cm. M: Frente y corona negras. Semicopete y nuca rojos. Ancha banda ocular blanca. Malar rojo oscuro. Garganta ocre punteada de negro. Dorso pardo negruzco barrado de amarillento. Ventral blanquecino moteado de negro.
H: Similar al macho, pero con banda malar completamente negra.



♀



Estrato: subdosel y sotobosque

Ph: Yanina Romero



Familia Falconidae

Pico curvo con borde dentado.

Excelente vista.

Garras con pronunciada forma de garfio.

Tarsos no emplumados.


Cola larga.

Algunas especies presentan
dicromatismo sexual.

Carancho *Caracara plancus*



Ph: Yanina Romero



Estrato: dosel y en vuelo

53 cm. Corona aplanada negra. Cara y cuello blancos. Cera y piel desnuda, del pico, anaranjado a rosado pálido. Pico grisáceo pálido. Pecho y dorso blanco barrado de negro. Abdomen y cobertoras pardo negruzco. Rabadilla y cola blancuzca con una banda terminal negra. Patas amarillas.

En vuelo: Primarias blancas con puntas negras.

Ph: Verónica Tejerina



Chimango *Daptrius chimango*




Ph: Venecia Herrera

38 cm. **M:** Plumaje parduzco, con manchas claras. Ceja pardo oscuro. Pico gris claro con cera rosácea. Ventral más pálido. Rabadilla blanca. Cola clara con leve estriado y banda apical negruzca. Patas amarillo pálido.

En vuelo: Franjas claras en las primarias y rabadilla blanca.

H: Similar al macho, pero con cera rosácea y patas grises.




En vuelo

Ph: Freddy Burgos



Ph: Verónica Tejerina




Halcón Negro Chico *Falco ruficularis*



Ph: Carlos Mariani

M: 24 cm / H: 38 cm. Cabeza y mejillas negras. Garganta y cuello ocráceo. Pecho negro barrado de blanco. Dorsal negro. Piernas rufas. Cola corta. Patas amarillas.



Estrato: dosel, subdosel
y en vuelo



Ph: Carlos Mariani

Familia Psittacidae

Generalmente verdes.

Cabeza grande.

Pico robusto muy curvo.

Alas largas y puntiagudas.

Patas cortas.


Dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás.

Cola larga.

Loro Maitaca *Pionus maximiliani*



Ph: Fabiana Sosa



Estrato: dosel
y subdosel

28 cm. Corona y pecho gris violáceo. Periocular desnudo blancuzco. Maxila negruzca. Mandíbula pálida. Coloración verde opaco en general. Subcaudal rojo. Cola corta.

Ph: Fabiana Sosa



Loro Alisero *Amazona tucumana*




Ph: Nadia Tejerina



32 cm. Enteramente verde. Frente roja. Periocular desnudo blanco. Pico rosáceo. Cobertoras primarias rojas, primarias con punta azul.

Migrante.



Estrato: dosel y subdosel


Loro Hablador *Amazona aestiva*




Ph: Sara Cabrera

36 cm. Coloración general verde. Frente celeste intenso. Cara y parte anterior de la corona amarillas. Periocular desnudo, blancuzco. Hombros amarillos o rojos. Pico negro.

En vuelo: Parche rojo en remeras secundarias.



En vuelo



Ph: Freddy Burgos


Chiripepé Cabeza Parda *Pyrrhura molinae*



Ph: Venecia Herrera



25 cm. Corona y nuca pardo grisáceas. Periocular blanquecino. Mejillas verdes. Pico gris. Pecho color pardo escamado en tonos más claros. Borde de las alas azulado. Mancha ventral rojo pálido. Cola larga roja. Patas grises.




Estrato: dosel y subdosel

Ph: Nadia Tejerina

Calancate Cara Roja *Psittacara mitratus*



Ph: Carlos Mariani




Estrato: dosel
y subdosel

35 cm. Coloración general verde. Frente, parte de la corona y manchas en cara, cuello y pecho rojas. Periocular desnudo, blanco. Iris anaranjado. Pico rosáceo.

Ph: Freddy Burgos





Familia Thamnophilidae

Pico robusto con gancho apical.

Alas cortas y redondeadas.

Patas fuertes.

Colores predominantes en plumaje:
gris, negro, blanco y castaño.

Presentan dicromatismo sexual.


Batará Gigante *Batara cinerea*



Ph: Venecia Herrera

32 cm. M: Corona eréctil negra. Pico robusto que termina en gancho. Cuello y ventral grisáceo. Dorso y cola negro finamente barrados de blanco. Patas grises.

H: Corona castaña a rufo intenso. Ventral canela agrisado. Dorso y cola ocre barrados de negro.



Estrato: sotobosque




Ph: Nadia Tejerina

Chororó *Taraba major*



Ph: Fabiana Sosa



Estrato: sotobosque

20 cm. M: Cabeza negra. Iris rojo. Pico robusto grisáceo. Ventral blanco. Dorso negro. Alas con filetes blancos. Cola negra con barrado ventral blanco.

H: Iris rojo. Garganta blanca. Cabeza, dorso y alas castaños. Sin filetes. Ventral canela pálido. Cola castaña sin barrado ventral.

Ph: Yanina Romero




Choca Corona Rojiza *Thamnophilus ruficapillus*



Ph: Nadia Tejerina

17 cm. M: Corona rufa. Cara grisácea. Iris castaño encendido. Pecho barrado de blanco y negro. Abdomen y subcaudal crema. Dorsal pardo. Cola con barrado ventral blanco y negro.
H: Dorsal más rufo. Ventral más acanelado, sin el barrado en el pecho.



Estrato: sotobosque

Ph: Nadia Tejerina




Choca Corona Negruzca *Thamnophilus caerulescens*



♂

Ph: Venecia Herrera


14 cm. M: Corona negra. Cabeza, ventral y dorso gris plumizo. Abdomen y subcaudal ocráceo. Cobertoras con filetes blancos. Ventral de la cola negro con manchas blancas.
H: Corona pardo rufo. Garganta y cuello blancuzco grisáceo. Ventral acanelado. Dorsal pardo.




Ph: Carlos Rossello

Ph: Venecia Herrera

Estrato: sotobosque



♂



♀



Familia Furnariidae

Plumaje predominante
de colores pardos.
Alas cortas y redondeadas.
Cola rígida con las puntas de
las plumas desnudas.
Sin dimorfismo sexual.


Tarefero *Sittasomus griseicapillus*



Ph: Sara Cabrera



15 cm. Cabeza pardo agrisado. Pico pequeño, fino y corto. Ventral gris. Dorsal bicolor, pardo grisáceo a rufo hacia la cola. Cola terminada en puntas.




Estrato: dosel y subdosel

Trepador Colorado *Dendrocolaptes picumnus*



Ph: Fabiana Sosa

26 cm. Cabeza, dorso y ventral pardo ocráceo. Corona y garganta ocráceas con leve estriado. Pico pálido, grueso y recto. Cobertoras, alas y cola color castaño.



Estrato: subdosel y sotobosque



Ph: Marisel Morales


Trepador Gigante *Xiphocolaptes major*



Ph: Nadia Tejerina



29 cm. Coloración general rufo castaño. Iris castaño. Pico grisáceo, largo, macizo, algo curvo. Loral y periorcular negruzcos. Cabeza y ventral más claros con leve estriado.



Estrato: subdosel y sotobosque


Ph: Nadia Tejerina

Chincherito Chico *Lepidocolaptes angustirostris*



Ph: Verónica Tejerina

20 cm. Corona y nuca pardas con un leve estriado claro. Ceja beige. Línea ocular negra. Pico pálido y curvado hacia abajo. Ventral claro sutilmente estriado. Dorso castaño rojizo.



Estrato: dosel y subdosel




Ph: Nadia Tejerina

Hornero *Furnarius rufus*



Ph: Nadia Tejerina

18 cm. Cabeza parda. Iris pardo. Garganta blanca. Ventral grisáceo acanelado. Subcaudal blanco. Dorsal pardo rojizo. Cola rufo encendido.



Zona urbanizada

Ph: Venecia Herrera




Leyenda del Hornero

Cuenta la leyenda que frente a la entrada de una choza, un indígena transformaba el barro en vasijas y platos. Era el mejor alfarero de su pueblo. Un día debía casarse con la joven más hermosa de la tribu, también alfarera. La noche previa a la boda el hechicero del pueblo advirtió sobre grandes desgracias derivadas de aquel matrimonio. Bajo tal influencia, el cacique prohibió su realización. Al enterarse, los enamorados huyeron. Los indígenas del lugar los persiguieron lanzando sus flechas, cuyas puntas envenenadas mataron a los jóvenes enamorados. Ambos se transformaron en hermosas aves que, empleando su habilidad para modelar, hacen su hogar en nidos de barro. Así nació el hornero, el ave nacional, siempre presente en los campos argentinos.

Ph: Yanina Romero

Fuente: Museo Miguel Lillo de Ciencias Naturales, 2020.




Ticotico Estriado *Syndactyla rufosuperciliata*



Ph: Fabiana Sosa

18 cm. Ceja fina ocrácea. Pico fuerte con mandíbula de base pálida y arqueada hacia arriba. Garganta blanca. Ventral pardo estriado de blanco. Dorsal pardo oliváceo. Cola rufa.



Estrato: subdosel y sotobosque

Ph: Verónica Tejerina




Ph: Verónica Tejerina



Curutié Blanco *Cranioleuca pyrrhophia*



Ph: Verónica Tejerina



Estrato: dosel y subdosel

14 cm. Corona anteada estriada de negro. Ancha ceja blanca. Línea ocular pardo oscuro. Garganta blanca. Ventral blanco agrisado. Dorso pardo grisáceo con hombros castaños. Cola castaña en puntas.

Ph: Verónica Tejerina




Pijuí Frente Gris *Synallaxis frontalis*



Ph: Carlos Rossello

16 cm. Frente y ceja gris. Corona y hombros rufo encendido. Ventral agrisado. Dorso pardo. Cola parda con plumas externas rufas.



Estrato: subdosel y sotobosque


Ph: Carlos Rossello



Pijuí Ceja Canela *Synallaxis azarae*



Ph: Jorge La Grotteria




17 cm. Mayormente gris. Corona rojiza. Frente parduzca. Ceja ocrácea. Ventral blanquecino. Alas rojizas. Cola larga rufo castaño.

Estrato: subdosel
y sotobosque

Ph: Venecia Herrera





Familia Tityridae

Cabeza grande.

Cola corta.

Plumajes variados.

Presentan dicromatismo sexual.

Anambé Negro *Pachyramphus polychopterus*




Ph: Sergio Moya

14 cm. M: Corona y frente negros. Ventral y espalda grises. Alas con dos bandas blancas en las cobertoras. Cola negra con ápices blancos.

H: Fina línea periorcular blancuzca. Vientre amarillento. Dorsal pardo. Alas pardas manchadas de ocráceo con una banda canela. Cola parda con una mancha canela en las plumas externas.

Migrante.



Estrato: subdosel



Anambé Grande *Pachyramphus validus*




Ph: Freddy Burgos

18 cm. M: Dorsal negro, más oscuro en la corona y en la nuca. Ventral grisáceo. Cola y alas negras con una mancha escapular blanca.



H: Corona y nuca grises. Ventral amarillento. Dorsal castaño. Alas castañas con bordes negros. Cola castaña.

Migrante.


Ph: Sara Cabrera



Ph: Sara Cabrera



Estrato: subdosel

The background is a solid purple color. Scattered across the entire surface are several white line-art outlines of feathers of various sizes and orientations. The feathers are stylized, showing the central rachis and the barbs branching off it.

Familia Tyrannidae


Pico fino con vibrisas y gancho apical.
Alas y tarsos largos.
Sin dimorfismo sexual.

Mosqueta Carasucia *Phylloscartes ventralis*



Ph: Yanina Romero

12 cm. Corona y dorsal oliva. Fina ceja pálida. Pico fino. Garganta más clara. Ventral amarillento. Cobertoras con bandas amarillo oliváceo. Cola larga y delgada.



Estrato: subdosel y dosel


Ph: Nadia Tejerina



Birro Chico *Pyrrhomyias cinnamomeus*



Ph: Yanina Romero



Estrato: subdosel

13 cm. Coloración general rufa. Corona oculta amarilla. Abdomen canela. Rabadilla ocre. Dorsal pardo oliváceo. Cobertoras y bordes de las terciarias rufo castaño.

Migrante.

Ph: Carlos Mariani




Piojito Silbón *Camptostoma obsoleum*



Ph: Nadia Tejerina

9 cm. Semicopete eréctil, gris uniforme. Línea supraloral pálida. Pico corto con mandíbula amarillenta. Nuca gris. Ventral blanquecino, algo agrisado en el pecho y pálido amarillo hacia el vientre. Espalda olivácea. Alas pardas con dos barras ocre.



Estrato: subdosel

Ph: Yanina Romero




Fiofío Pico Corto *Elaenia parvirostris*



Ph: Verónica Tejerina

14 cm. Cabeza redondeada con fina línea blanca central, a veces oculta. Ligera cresta. Periocular blanco. Garganta y pecho agrisados. Ventral grisáceo. Dorso pardo oliváceo. Tres bandas alares pálidas.

Migrante.



Estrato: subdosel



Ph: Nadia Tejerina


Fiofío Oscuro *Elaenia obscura*



Ph: Nadia Tejerina



18 cm. Sin copete con corona pardo oliváceo. Anillo periocular incompleto amarillento. Ceja amarilla. Pico pequeño. Pecho oliva grisáceo. Vientre más amarillento. Dorsal pardo oliváceo. Alas más oscuras con dos bandas ocráceas a blancas en cobertoras. Cola larga.



Estrato: subdosel

Ph: Venecia Herrera


Mosqueta Pico Curvo *Phyllomyias burmeisteri*



Ph: Venecia Herrera

11 cm. Corona oliva. Ceja blanca muy fina. Iris pardo. Pico corto con la maxila un poco curvada. Mandíbula rosácea. Dorsal oliváceo. Dos bandas alares acaneladas en las cobertoras. Vientre amarillo con estrías oliva difusas en el pecho.

Migrante.



Estrato: dosel y subdosel



Ph: Sergio Moya

Mosqueta Corona Gris *Phyllomyias sclateri*




Ph: Freddy Burgos

12 cm. Corona gris plumizo, más oscura que el resto de la cabeza. Ceja blanca. Pico corto. Garganta y pecho grisáceos, tornándose amarillentos hacia el vientre. Dorso oliva. Dos bandas alares blancuzcas en las cobertoras. Cola gris larga.

Migrante.

Ph: Venecia Herrera




Estrato: dosel y subdosel



Piojito Gargantilla *Mecocerculus leucophrys*



Ph: Yanina Romero



Estrato: subdosel

13 cm. Ceja fina blanca. Garganta abultada blanca. Pecho gris oliváceo. Vientre y abdomen amarillentos. Dorso pardo oliváceo. Cola y alas pardo oscuro con dos bandas alares blancas. Cola larga.

Ph: Yanina Romero



Ph: Verónica Tejerina




Piojito Vientre Blanco *Serpophaga subcristata munda*



Ph: Yanina Romero

10 cm. Corona con una mancha blanca no muy oculta. Ceja fina blanca sobre una línea ocular oscura. Pico corto. Ventral blancuzco. Dos bandas alares claras en las cobertoras. Espalda agrisada.



Estrato: subdosel


Ph: Verónica Tejerina



Benteveo *Pitangus sulphuratus*



Ph: Verónica Tejerina




Zona urbanizada

22 cm. Cabeza negra. Corona oculta eréctil amarilla. Ceja blanca que se extiende hasta la nuca. Garganta blanca. Pico robusto. Vientre amarillo. Alas y cola marrones con bordes rojizos.

Ph: Sara Cabrera



Ph: Nadia Tejerina




Picabuey *Machetornis rixosa*



Ph: Verónica Tejerina



18 cm. Cabeza gris con corona oculta anaranjada. Iris castaño. Leve línea ocular parda. Garganta blancuzca. Ventral amarillo. Dorsal pardo grisáceo. Alas y cola marrones con bordes más claros.



Estrato: sotobosque

Ph: Venecia Herrera


Benteveo Rayado *Myiodynastes maculatus*



Ph: Carlos Mariani

20 cm. Totalmente rayado. Color pardo en el dorso y blanquecino en el pecho, amarillento muy suave hacia el ventral. Línea ocular ancha y línea malar más fina, negras. Pico robusto y grande. Cola parda con bordes externos de timoneras y supracaudales rufas.

Migrante.



Estrato: dosel y subdosel



Ph: Yanina Romero

Suirirí Real *Tyrannus melancholicus*




Ph: Sara Cabrera



21 cm. Cabeza gris ceniciento. Corona oculta naranja. Pico robusto. Gular y garganta blancuzcas. Pecho amarillo agrisado y resto ventral amarillo intenso. Espalda olivácea. Remeras, cobertoras y cola furcada pardas, con bordes más claros.

Migrante.




Estrato: dosel y subdosel

Ph: Nadia Tejerina

Burlisto Corona Negra *Myiarchus tuberculifer*



Ph: Sergio Moya



Estrato: subdosel

16 cm. Corona negra. Pico grande. Garganta y pecho agrisados. Ventral amarillo pálido. Dorso oliváceo. Alas y cola pardas.

Ph: Marisel Morales



Burlisto Copetón *Contopus fumigatus*




Ph: Venecia Herrera



17 cm. Gris parduzco. Copete eréctil en forma triangular. Pico con mandíbula amarilla. Ventral gris claro. Filetes claros en cubiertas y remeras.

Migrante.



Estrato: subdosel

Ph: Nadia Tejerina



Familia Vireonidae

Picos cortos, robustos y terminados en punta en forma de gancho.
Dorsalmente verdosos.
Sin dimorfismo sexual.


Juan Chiviro *Cyclarhis gujanensis*



Ph: Yanina Romero



15 cm. Corona y frente pardas. Sutil ceja rufo amarronado. Iris amarillo anaranjado. Mejillas gris claro. Pico rosáceo, robusto. Collar dorsal gris claro. Pecho amarillento. Ventral claro agrisado. Dorsal oliváceo.




Estrato: subdosel

Ph: Yanina Romero

Chiví-chiví *Vireo chivi*



Ph: Carlos Rossello



Estrato: dosel
y subdosel

14 cm. Corona gris. Ceja blancuzca. Fina línea negra entre la corona y la ceja. Línea ocular negruzca. Pecho agrisado. Ventral blancuzco. Dorsal oliváceo. Subcaudal amarillo pálido.

Ph: Yanina Romero






Familia Corvidae

Plumaje azulado.
Pico robusto.
Patas fuertes.
Cola larga y redondeada.
Sin dimorfismo sexual.

Urraca Criolla *Cyanocorax chrysops*



Ph: Venecia Herrera



Estrato: subdosel y sotobosque

33 cm. Redondeada cresta negra. Cabeza y pecho negro. Ceja, nuca y corta línea, bajo el ojo, azul brillante. Iris amarillo. Ventral crema amarillento. Dorsal azul oscuro. Cola con banda apical blanco amarillento.

Ph: Verónica Tejerina

Ph: Verónica Tejerina





Familia Hirundinidae

Pico y cuello cortos.

Alas largas y agudas.

Generalmente con cola ahorquillada.


Plumaje oscuro, negro azulado o pardo,
con zonas blancas.

Patas cortas con dedos frontales
parcialmente unidos por la base.

Golondrina Barranquera *Pygochelidon cyanoleuca*



Ph: Venecia Herrera




12 cm. Pico corto con antifaz negro mate. Ventral blanco. Subcaudal negro. Dorsal y rabadilla azul negruzco brillante. Alas negruzcas. Cola corta y levemente ahorquillada.

Ph: Verónica Tejerina



Ph: Verónica Tejerina




Colondrina Parda *Progne tapera*



Ph: Nadia Tejerina

17 cm. Pico grande. Collar pardo. Garganta blanca. Banda marrón en el pecho. Ventral blanco. Dorsal pardo. Alas negruzcas. Rabadilla blanca. Patas negras.


Migrante.



Ph: Verónica Tejerina




Ph: Yanina Romero



Colondrina Doméstica *Progne chalybea*



Ph: Carlos Rossello



En vuelo


18 cm. M: Azul oscuro brillante. Pico grande. Garganta y pecho blancuzcos con algo de gris. Ventral blanco y rabadilla blanca. Alas negras. Cola negra, levemente ahorquillada.

H: Azul oscuro menos brillante.

Migrante.

Ph: Verónica Tejerina

Ph: Verónica Tejerina



Golondrina Negra *Progne elegans*




Ph: Nadia Tejerina

19 cm. M: Plumaje negro azulado brillante con tonos violáceos. Pico corto. Alas negras, largas y puntiagudas. Cola negra, levemente ahorquillada.


H: Dorsal y cuello oscuro. Ventral pardo moteado sobre pardo pálido.

Migrante.




En vuelo

Ph: Venecia Herrera



Ph: Venecia Herrera



The background is a solid purple color with several white line-art feathers scattered across it. The feathers are of various sizes and orientations, some pointing upwards, some downwards, and some horizontally. The central text is in white, providing a high contrast against the purple background.

Familia Troglodytidae


Cuerpo rechoncho.
Coloración modesta.
Pico fino, largo y algo curvo.
Cola corta y recta.
Sin dimorfismo sexual.

Ratona *Troglodytes aedon*



Ph: Carlos Mariani

11 cm. Iris pardo oscuro. Periocular blancuzco. Pico fino. Dorsal pardo amarronado. Ventral acanelado. Alas y cola pardo rufo con barrado más oscuro. Rabadilla apenas rufa.



Estrato: subdosel y sotobosque

Ph: Venecia Herrera




Ph: Yanina Romero



Ratona Ceja Blanca *Troglodytes solstitialis*



Ph: Carlos Mariani




Estrato: subdosel


10 cm. Pico fino. Ancha ceja blanca. Línea postocular y dorsal pardo oscuro. Ventral castaño claro. Remeras, subcaudal y cola barradas de pardo oscuro.

Ph: Verónica Tejerina



Ph: Nadia Tejerina






Familia Turdidae

Pico casi recto.
Alas largas y agudas.
Tarsos fuertes.
Plumaje gris o de tonos pardos.
Sin dimorfismo sexual.

Zorzalito Boreal *Catharus ustulatus*



Ph: Venecia Herrera



Estrato: subdosel

18 cm. Periocular pálido. Línea malar oscura. Pico corto. Cuello y pecho manchados. Dorsal pardo amarronado. Ventral blancuzco.

Migrante.

Ph: Nadia Tejerina




Zorzal Colorado *Turdus rufiventris*



Ph: Sara Cabrera

24 cm. M: Periocular amarillo. Iris pardo. Pico gris amarillento. Dorsal pardo grisáceo. Garganta estriada de blanco. Pecho agrisado. Abdomen rufo encendido.
H: Más apagada, con menos presencia de color rufo en la zona del vientre y pico más negruzco.




Estrato: subdosel y sotobosque

Ph: Venecia Herrera



Ph: Verónica Tejerina



Leyenda del Zorzal Colorado

Zorzal era un joven guaraní que amaba profundamente a una doncella llamada Agüaí. Ellos daban fe del infinito amor que los jóvenes se profesaban. Zorzal conocía todos los secretos del monte porque era un hábil cazador. Todas las mañanas, salía en busca de sus más preciadas piezas y por las tardes guardaba el tiempo para su bella Agüaí. Como el joven tenía la virtud de tocar la flauta dulce le hacía canciones y se las dedicaba amorosamente. Lamentablemente la relación de los jóvenes no a todos los conformaba y a raíz de ello, sucedió algo inesperado. El chamán celoso de Zorzal, fue a ver al cacique, le habló en contra de la pareja y lo convenció que el joven traería desgracias a la comunidad. El cacique, sin objetar los dichos del chamán, buscó a Zorzal y lo puso en cautiverio, para ser ejecutado, lo ataron a una gran piedra y sin mediar palabras una lluvia de flechas cayó sobre su pecho, al instante, con el corazón deshecho, Zorzal se desplomó. Agüaí desesperada corrió a buscarlo, y para su sorpresa, del cuerpo herido de su amado surgió un ave con el pecho rojo empapado en sangre y un bello sonido de flauta tal como era el canto de amor de su joven Agüaí comprendió que Tupá les había obsequiado éste ave de pecho rojo y dulce canto, para que nunca lo olvidaran.

Ph: Sara Cabrera

Fuente: Identidad Cultural, 2023.



Zorzal Chalchalero *Turdus amaurochalinus*




Ph: Nadia Tejerina



22 cm. M: Pico amarillo. Garganta blanca estriada de oscuro. Loral negro. Ventral crema agrisado. Dorsal pardo oliváceo.

H: Pico oscuro. Dorsal parduzco.



Estrato: subdosel

Ph: Verónica Tejerina


Zorzal Cabeza Negra *Turdus nigriceps*



Ph: Nadia Tejerina

25 cm. M: Cabeza negro brillante. Periocular, pico y patas amarillo anaranjado. Garganta blancuzca con estriado oscuro. Ventral más claro. Dorsal plumizo.


H: Parda. Garganta clara estriada. Alas pardo oscuro. Muy similar al juvenil.



Estrato: subdosel



Ph: Sara Cabrera

The background is a solid purple color with several white line-art feathers scattered across it. The feathers are of various sizes and orientations, some pointing upwards, some downwards, and some horizontally. The central text is in white, providing a high-contrast look.

Familia Passeridae

Gorriones.

Suelen ser aves pequeñas.

Pico fuerte y robusto.


Cola corta.

Generalmente plumaje con tonalidades marrones, pardas o grisáceas.

Gorrión *Passer domesticus*



Ph: Verónica Tejerina



Zona urbanizada


15 cm. M: Corona gris. Mejillas blanco grisáceo. Pico grueso. Nuca y postocular marrón. Mancha ocular blanca. Garganta y loreal negros. Ventral blanco agrisado. Dorso pardo manchado de negro.

H: Pardo grisáceo. Ancha ceja postocular crema. Ventral más claro.

Especie introducida.

Ph: Verónica Tejerina

Ph: Yanina Romero





Familia Fringillidae

Pico corto y agudo.

Alas puntiagudas y estrechas.


Cola cuadrada.

Presentan dicromatismo sexual,
generalmente el macho con plumaje
más vistoso que la hembra.

Cabecitanegra *Spinus magellanicus*



Ph: Verónica Tejerina



Estrato: subdosel y sotobosque

11 cm. M: Cabeza, nuca y garganta negras. Pico cónico, puntiagudo. Ventral amarillo. Dorso amarillo oliváceo estriado de negro. Alas y cola negras con franjas amarillas. Cola levemente ahorquillada.

H: Coloración amarillo olivácea sin negro en la cabeza.

Ph: Carlos Mariani




Tangará Cabeza Celeste *Chlorophonia cyanocephala*



Ph: Nadia Tejerina

11 cm. M: Cara, frente y garganta negro azulado. Corona y semicollar dorsal celeste encendido. Ventral y rabadilla amarillo oro. Dorso y cola negro azulado brillante.

H: Frente anaranjada. Corona y semicollar celeste encendido. Cara y dorsal verde oliva. Ventral amarillo verdoso.



Estrato: dosel


Ph: Fabiana Sosa



Tangará Garganta Negra *Euphonia chlorotica*



Ph: Sara Cabrera




Estrato: dosel y subdosel

10 cm. M: Cabeza y garganta negro azulado o violáceo con amplia frente amarillo oro. Pico robusto. Ventral amarillo encendido. Cola negro azulado con zonas blancas.

H: Ventral gris blancuzco. Flancos amarillo oliva. Dorso gris oliva.

Ph: Yanina Romero

Ph: Yanina Romero






Familia Passerellidae

Pico robusto, corto y cónico.
Plumaje vistoso.
Algunas especies presentan
dimorfismo sexual.

Frutero Yungueño *Chlorospingus flavopectus*



Ph: Verónica Tejerina



Estrato: dosel, subdosel
y sotobosque

14 cm. Cabeza gris parduzco. Postocular blanco. Mejillas gris oscuro. Garganta blanquecina triangular. Pecho amarillo. Abdomen y vientre blanco agrisado. Dorsal oliva.

Ph: Venecia Herrera




Cerquero Viente Blanco *Arremon torquatus*



Ph: Nadia Tejerina

19 cm. Cabeza negra con línea central y cejas blancas. Garganta blanca. Ventral blanco con flancos grises. Dorsal y cola oliva.



Estrato: sotobosque


Ph: Venecia Herrera



Cerquero Yungueño *Arremon dorbignii*



Ph: Venecia Herrera




15 cm. Cabeza negra con línea central gris. Cejas blancas. Pico amarillo anaranjado intenso con línea negra en el centro. Garganta blanca. Collar negro. Ventral blanco con flancos gris plumizo. Dorsol oliva.

Estrato: sotobosque

Ph: Yanina Romero

Ph: Venecia Herrera




Chingolo *Zonotrichia capensis*



Ph: Yanina Romero

13 cm. Cabeza gris plomo. Copete retráctil con dos líneas negras. Línea postocular y malar negro. Pico gris. Cuello rufo intenso. Garganta blanca. Ventral grisáceo. Dorsal pardo con líneas negras.




Zona urbanizada

Ph: Yanina Romero




Ph: Verónica Tejerina



Cerquero Cabeza Castaña *Atlapetes fulviceps*



Ph: Yanina Romero



Estrato: sotobosque

17 cm. Cabeza rufo castaño. Malar, mancha loreal y garganta amarillo encendido. Bigotes rufos. Pecho oliva. Ventral amarillo con flancos oliva. Dorsal verde oliva.

Ph: Verónica Tejerina

Ph: Nadia Tejerina






Familia Icteridae

Plumajes vistosos negros.
Pico cónico, recto y agudo.
Patas fuertes.
Alas largas y puntiagudas.
Algunas especies presentan
dimorfismo sexual.

Yapú *Psarocolius decumanus*



Ph: Venecia Herrera




Estrato: dosel y subdosel

M: 46 cm / H: 35 cm. Pico amarillo marfil. Plumas largas negras, ocultas en la corona. Iris celeste intenso. Ventral negro (puede presentar manchas claras). Rabadilla y subcaudal rufo castaño. Cola dorsalmente negra, ventralmente amarillo intenso.

Ph: Venecia Herrera

Ph: Nadia Tejerina




Boyero Ala Amarilla *Cacicus chrysopterus*




Ph: Carlos Mariani

20 cm. Pico marfil o celeste pálido. Iris blanco. Plumaje general negro. Línea amarilla que nace en el hombro. Rabadilla amarillo intenso, que puede estar oculta.



Estrato: subdosel

Ph: Yanina Romero




Boyerito *Icterus pyrrhopterus*



Ph: Nadia Tejerina

21 cm. Pico fino y agudo. Iris castaño rojizo. Plumaje negro opaco. Hombros rufos. Cola larga y angosta con esquinas redondeadas.



Estrato: subdosel




Ph: Yanina Romero

Tordo Pico Corto *Molothrus rufoaxillaris*



Ph: Venecia Herrera

20 cm. Plumaje negro poco brillante con tonos azulados. Iris rojizo o pardo. Pico corto y triangular. Mancha oculta subalar en borde de axilas rufo castaño. Patas negras.




Estrato: subdosel y sotobosque

Ph: Venecia Herrera




Ph: Venecia Herrera



Tordo Renegrado *Molothrus bonariensis*



Ph: Sara Cabrera



Zona urbanizada


20 cm. M: Plumaje brillante, negro azulado con tonos violáceos. Iris oscuro. Pico cónico, recto, agudo y negro. Patas largas, delgadas y negras.

H: Gris pardo, más claro en la parte inferior.

Ph: Venecia Herrera



Ph: Verónica Tejerina




Tordo Músico *Agelaioides badius*



Ph: Venecia Herrera

18 cm. Coloración general pardo grisáceo. Pico negro opaco. Loréal negro intenso. Vientre más claro. Remeras rufo castaño, secundarias negruzcas con bordes rufos. Cola y patas negruzcas.




Zona urbanizada

Ph: Verónica Tejerina



Ph: Venecia Herrera





Familia Parulidae

Arañeros.
Plumaje llamativo.
Pico fino y recto.
Cola redondeada.
Algunas especies presentan
dimorfismo sexual.


Arañero Cara Negra *Geothlypis velata*



Ph: Verónica Tejerina

13 cm. M: Antifaz negro. Corona gris plumizo. Pico negro. Dorsal oliváceo. Ventral amarillo brillante.

H: Similar al macho. Sin antifaz, con mejillas grises. Anillos oculares amarillos. Franjas amarillas del pico a los ojos. Dorsal pardo grisáceo.




Estrato: subdosel

Ph: Carlos Rossello




Ph: Carlos Rossello



Pitayumí *Setophaga pitayumi*



Ph: Verónica Tejerina



Estrato: dosel y subdosel

11 cm. Antifaz negro. Fino pico amarillo con culmen negro. Garganta anaranjada. Ventral amarillo oro. Dorsal azul grisáceo. Mancha amarillo oliva en la espalda. Alas con dos filetes blancos y rebordes negros.

Ph: Venecia Herrera

Ph: Nadia Tejerina




Arañero Ceja Amarilla *Myiothlypis signata*



Ph: Verónica Tejerina

13 cm. Corona oliva. Ancha ceja amarillo intenso. Pico negro. Ventral amarillo encendido. Dorsol oliváceo. Patas color rosado amarillento.

Migrante.



Estrato: sotobosque


Ph: Verónica Tejerina



Arañero Coronado Grande *Myiothlypis bivittata*



Ph: Carlos Mariani



Estrato: subdosel y sotobosque

13 cm. Corona negruzca con línea central anaranjada oculta. Fina ceja amarilla. Ventral amarillento oliva. Dorso oliva. Patas amarillo rosáceo brillante.

Ph: Nadia Tejerina

Ph: Verónica Tejerina




Arañero Coronado Chico *Basileuterus culicivorus*



Ph: Carlos Rossello

12 cm. Corona gris oscura con línea central anaranjada oculta. Ceja blancuzca. Mejillas y cuello grisáceos. Ventral amarillo oro. Dorso gris oliváceo. Patas anaranjado claro.

Migrante.



Estrato: sotobosque

Ph: Carlos Rossello




Ph: Carlos Rossello



Arañero Corona Rojiza *Myioborus bruniceps*



Ph: Venecia Herrera




Estrato: dosel,
subdosel y sotobosque

13 cm. Corona eréctil rojiza. Semianillo ocular blanco. Cabeza y cuello grises. Dorsol pardo oliva. Ventral, desde el gular, amarillo intenso. Alas grises. Cola negruzca con timoneras laterales blancas.

Ph: Fabiana Sosa

Ph: Yanina Romero





Familia Cardinalidae

Pico robusto, corto y cónico.

Plumaje colorido.

Alas largas y redondeadas.


Cola larga y angosta.

Presentan dimorfismo sexual.

Fueguero *Piranga flava*



Ph: Verónica Tejerina



Estrato: subdosel


18 cm. M: Rojo anaranjado. Corona y garganta color más intenso. Pico oscuro y grueso. Dorsal más rufo. Mejillas, flancos y espalda más descoloridos con tonos grises. H: Amarilla. Dorsal oliva.

Ph: Venecia Herrera

Ph: Venecia Herrera



Rey del Bosque *Pheucticus aureoventris*




Ph: Venecia Herrera



21 cm. M: Cabeza negra. Pico negruzco con partes grises. Pechera negra. Ventral amarillo con leve moteado negro hacia los flancos del vientre y abdomen. Dorsal negro. Manchas blancas en remeras y cubiertas. Patas gris claro.


H: Similar al macho, sin pechera negra. Garganta y pecho moteado de negro.



Estrato: subdosel

Ph: Fabiana Sosa


Reinamora Grande *Cyanoloxia brissonii*



Ph: Carlos Rossello



Ph: Yanina Romero




Estrato: dosel, subdosel y sotobosque


15 cm. M: Plumaje azul oscuro. Pico cónico y robusto. Frente azul brillante. Alas negras con hombros azul brillante. Cola negra.

H: Ventralmente canela. Dorso castaño. Alas y cola pardo oscuro.

Ph: Yanina Romero

Ph: Yanina Romero



The background is a solid red color with several white line-art outlines of feathers scattered across it. The feathers vary in size and orientation, some pointing upwards and others downwards.


Familia Thraupidae

Plumaje vistoso.
Pico robusto y cónico.
La mayoría de las especies presentan
dimorfismo sexual.

Jilguero Dorado *Sicalis flaveola*



Ph: Venecia Herrera




Estrato: subdosel y sotobosque

13 cm. M: Amarillo brillante. Frente, loreal y gular naranjas. Amarillo más oliva en alas, dorso y cola. Dorsal estriado de gris parduzco.

H: Parda con estriado más oscuro. Ventral blancuzco con estriado oscuro en garganta, pecho y flancos del vientre.

Ph: Verónica Tejerina

Ph: Carlos Mariani




Corbatita Overo *Sporophila lineola*



Ph: Verónica Tejerina


11 cm. **M:** Cabeza negra. Frente y mejillas blancas. Pico negro. Gular y garganta negros. Pecho y abdomen blancos. Dorsal negro. Banda alar blanca. Rabadilla blanca.

H: Pardo acanelado. Abdomen más claro. Pico claro.



Estrato: subdosel y sotobosque

Ph: Venecia Herrera




Ph: Venecia Herrera



Corbatita *Sporophila caerulescens*



Ph: Venecia Herrera





Estrato: subdosel y sotobosque

11 cm. M: Bigote blanco. Pico amarillo pálido. Parche gular negro. Garganta blanca. Fino collar negro en el pecho. Ventral blanco. Dorsal gris.

H: Pardo acanelado uniforme. Pico bicolor, gris arriba y amarillento abajo.

Ph: Nadia Tejerina

Ph: Venecia Herrera




Pepitero Gris *Saltator coerulescens*



Ph: Yanina Romero

20 cm. Ceja blanca corta. Cara gris. Pico negro. Iris marrón. Gular anteado. Ventral canela agrisado. Dorsal gris desde la corona. Alas y cola negruzcas. Patas grisáceas.



Estrato: subdosel y sotobosque


Ph: Yanina Romero



Pepitero de Collar *Saltator aurantiirostris*




Ph: Sara Cabrera




Estrato: subdosel y sotobosque

19 cm. Cabeza negra. Pico anaranjado. Ceja postocular blanca desde la mitad del ojo hasta el cuello. Garganta blanca. Collar negro. Pecho gris ceniza degradado a canela en el vientre. Dorsal y cola grises.

Ph: Yanina Romero



Ph: Verónica Tejerina




Tangará Gris *Thlypopsis sordida*



Ph: Carlos Rosello



13 cm. Cabeza amarilla. Corona naranja. Pico fino. Garganta amarilla. Ventral grisáceo anteaado. Dorsal y cola grisáceos. Época reproductiva: Corona naranja más intenso.



Estrato: dosel y subdosel


Ph: Carlos Rosello

Tangará Alisero *Thlypopsis ruficeps*



Ph: Jorge La Grotteria

12 cm. Amarillo oliváceo. Cabeza rufo anaranjado encendido. Pico delgado. Garganta y ventral amarillos. Flancos grisáceos. Dorsal gris oliváceo. Alas y cola pardas.



Estrato: subdosel



173

Ph: Alejandra Sosa

Monterita Ceja Rojiza *Microspingus erythrophrys*




Ph: Carlos Mariani

14 cm. M: Corona y mejillas gris plomo. Cejas, garganta y ventral castaño encendido. Dorsal gris con tono rufo acanelado. Alas negruzcas, las primarias ribeteadas de blanco, las secundarias de canela. Cola negra con bordes blancos.

H: Acanelada. Más clara en el ventral.

Ph: Venecia Herrera




Estrato: subdosel y sotobosque



Espiguero Pardo *Asemospiza obscura*



Ph: Jorge Schlemmer



Estrato: subdosel

11 cm. Pico bicolor, mandíbula clara y maxila oscura. Ventral pardo claro. Dorsal más oscuro. Patas rosáceas.
Migrante.

Ph: Jorge Schlemmer



Saíra de Antifáz *Pipraeidea melanonota*




Ph: Jorge Schlemmer



14 cm. M: Iris rojo. Corona y nuca celestes. Antifaz negro. Garganta y ventral amarillo pálido. Dorsal azul oscuro parduzco. Espalda y rabadilla azul claro.

H: Tonalidad más opaca. Espalda gris parduzco.




Estrato: dosel y subdosel

Naranjero *Rauenia bonariensis*



Ph: Venecia Herrera





Estrato: subdosel

17 cm. M: Cabeza y cuello celeste intenso. Antifaz negro. Iris castaño rojizo. Ventral y rabadilla amarillo anaranjado. Dorsal negro. Rabadilla naranja. Alas celestes.
 H: Parda agrisada. Corona celeste pálido. Dorsal oliva pálido.

Ph: Nadia Tejerina

Ph: Verónica Tejerina




Celestino *Thraupis sayaca*



Ph: Venecia Herrera

15 cm. Gris celeste. Ojos grandes y negros. Pico gris azulado. Ventral gris claro. Abdomen blanquecino. Dorso gris con tono celeste. Alas y cola celeste con tonos azules. Patas gris azulado.



Estrato: dosel y subdosel

Ph: Sara Cabrera



Ph: Venecia Herrera





Picaflor Verde hembra (*Chlorostilbon lucidus*)
Ph: Sara Cabrera

A

ANTEADO/DA: Café amarillento claro.

AHORQUILLADO/DA: Que tiene las plumas externas de la cola con una mayor longitud que las centrales.

B

BANDA APICAL: Franja de distinto color ubicada en un extremo.

BARRADO/DA: Con varias o muchas barras en sentido horizontal, de igual, mayor o menor tamaño.

C

CARROÑERO/RA: Ave que se alimenta de animales muertos o en descomposición.

CARÚNCULA: Protuberancia carnosa que presentan algunas aves en la cabeza y el cuello, generalmente de colores vivos.

CAUDAL: Perteneciente o relativo a la cola.

CERÁ: Membrana desnuda hinchada en la base superior del pico.

COBERTORAS ALARES: Plumas pequeñas que recubren la parte exterior de las alas.

COLA FURCADA: Cola con las plumas laterales un poco más largas que las centrales.

CULMEN: Parte superior de la mandíbula.

D

DEDOS PALMEADOS: Dedos unidos por una membrana.

DIMORFISMO SEXUAL: Diferencias físicas notables entre macho y hembra de una misma especie.

DICROMATISMO SEXUAL: Diferencia en la coloración del plumaje entre macho y hembra de una misma especie.

DIURNOS/AS: Que se encuentra activo durante el día.

DORSO: Región anatómica del ave comprendida entre la parte posterior del cuello y la rabadilla.

E

ECOTONO: Zona de transición entre dos ecosistemas diferentes.

ESPINAL: Bosques bajos de especies leñosas xerófilas, presenta un solo estrato con ramaje espinoso y hojas pequeñas.

ESPOLÓN: Proyecciones óseas con una capa córnea externa que se encuentra en patas y alas de algunas aves. Tiene forma cónica y se utiliza como arma de ataque.

ESTRIADO/DA: Plumaje con líneas longitudinales a lo largo del cuerpo.

EXÓTICO/CA: Especie que se encuentra fuera de su área natural de distribución.

F

FILETE: Borde terminal, apical muy fino, angosto.

FLANCOS: Laterales de la zona ventral del cuerpo.

FRUGÍVORO/RA: Que se alimenta de frutos.

G

GREGARIO/RIA: Tendencia a agruparse en bandadas o colonias junto con individuos de su especie u otra especie.

GULAR: Referida a la garganta.

I

IRIDISCENTE: Reflejo de distintos colores debido a un efecto óptico de la luz.

L

LORAL: Zona ubicada entre el pico y el ojo.

M

MÁCULAS: Manchas o conjuntos de manchas bien definidas.

MALAR: Área comprendida entre las zonas auricular, loreal y gular.

MAXILA: Parte inferior del pico.

MIGRACIÓN: Desplazamiento cíclico de individuos o poblaciones enteras de una especie desde el área donde desarrollan parte de su ciclo vital hacia otra, donde lo continúan o completan.

MIMÉTICO/CA: Plumaje que presenta una coloración muy similar al entorno o ambiente que lo rodea.

MONTE: Área montañosa con predominio de arbustos, también hay árboles y hierbas.

MORFO: Variaciones de plumaje dentro de una población de una especie.

MOTAS: Manchas o conjuntos de manchas poco definidas.

O

OCRÁCEO: Color empleado para hacer referencia a diversas tonalidades de ocre, pardos o acanelados.

P

PALUSTRE: Perteneciente a áreas húmedas o semi inundadas.

PARDO: Color que se asemeja al marrón.

R

RABADILLA: Parte del cuerpo del ave donde termina el dorso y comienza la cola.

RECTRICES: También llamadas timoneras, son las plumas de la cola de un ave.

REMERAS: Plumas de las alas implicadas en el vuelo.

RIBETEADOS/AS: Referente a un contorno de coloración distinta.

RUFO: Color marrón rojizo.

S

SUBCAUDAL: Plumas pequeñas que cubren la base de las rectrices, por la parte inferior del cuerpo del ave.

T

TAPADAS: Tapadas alares. Plumas que recubren las remeras ventralmente.

TARSO: Parte más delgada de la pata de un ave, que une los dedos con la tibia. En ciertas especies, están cubiertas de plumas pequeñas o plumones.

TIMONERAS: Sinónimo de rectrices.

V

VIBRISAS: Plumas modificadas con apariencia de pelos gruesos. Se encuentran generalmente alrededor del pico en las aves insectívoras.

VINOSO/SA: Semejante al color del vino tinto, rojizo purpúreo.



Naranjero (*Rauenia bonariensis*)
Ph: Nadia Tejerina

ArgentiNat (2022). Recuperado (en línea) de <https://www.argentinat.org> (20/02/2022).

Capllonch, P. (2018). "Un panorama de las migraciones de aves en Argentina. Hornero". *Migraciones de aves en Argentina* [online] (vol. 33: 01-18). ISSN 0073-3407.

De La Peña, M. R. (2015). *Aves argentinas. Incluye nidos y huevos* (Tomo 1). Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones UNL; Eudeba.

De La Peña, M. R. 2015. *Aves argentinas. Incluye nidos y huevos* (Tomo 2). Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones UNL; Eudeba.

eBird. (2002). *eBird Basic Dataset*. Ithaca, New York: Cornell Lab of Ornithology.

El Tribuno (2020). Recuperado (en línea) de <https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2020-1-2-1-0-0--kakuy-el-ave-de-la-leyenda-que-fascino-a-los-jujenos> (20/02/2022).

Identidad Cultural (2023). Recuperado (en línea) de <https://www.identidad-cultural.com.ar/leernota.php?cn=5477> (20/02/2022).

López-Lanús, B. (2020). *Guía Audiornis de las aves de Argentina, fotos y sonidos. Identificación por características contrapuestas y marcas sobre imágenes*. Buenos Aires, Argentina: Edición de campo; Audiornis Producciones.

BIBLIOGRAFÍA

MAYDS y AA (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Aves Argentinas) (2017). *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas (edición electrónica). Buenos Aires, Argentina.

Museo Miguel Lillo de Ciencias Naturales (2020). Recuperado (en línea) de https://www.facebook.com/200405633361552/posts/2962719327130155/?paipv=0&eav=AfbMaORglz7Tel7Yt5pr_Z-2MILp2XIYBU_MW66aHRuLC_rH7_2WomaorO8PecSxD8E&_rdr (20/02/2022).

Narosky, T. y Yzurieta, D. (2010). *Aves de Argentina y Uruguay - Birds of Argentina & Uruguay: guía de identificación edición total - a field guide total edition*. (16a ed.) Buenos Aires, Argentina: Vásquez Mazzini Editores.



Loro Maitaca (*Pionus maximillani*)
Ph: Fabiana Sosa

ÍNDICE DE NOMBRES COMUNES

	Pág.
A	
Aguilucho Cola Corta	59
Aguilucho Ñanco	58
Anambé Grande	100
Anambé Negro	99
Arañero Cara Negra	156
Arañero Ceja Amarilla	158
Arañero Corona Rojiza	161
Arañero Coronado Chico	160
Arañero Coronado Grande	159
B	
Bandurria Boreal	49
Batará Gigante	83
Benteveo	111
Benteveo Rayado	113
Birro Chico	103
Boyerito	151
Boyero Ala Amarilla	150
Burlísto Copetón	116
Burlísto Corona Negra	115
C	
Cabecitanegra	139
Calancate Cara Roja	81
Carancho	73
Carpinterito Barrado	67
Carpintero Dorado Gris	70

ÍNDICE DE NOMBRES COMUNES

Carpintero Lomo Blanco	69
Carpintero Oliva Yungueño	68
Carpintero Real	71
Celestino	178
Cerquero Cabeza Castaña	147
Cerquero Vientre Blanco	144
Cerquero Yungueño	145
Chiflón	44
Chimango	74
Chincheró Chico	91
Chingolo	146
Chiricote	40
Chiripepé Cabeza Parda	80
Chiví-chiví	119
Choca Corona Negruzca	86
Choca Corona Rojiza	85
Chororó	84
Corbatita	169
Corbatita Overo	168
Cuclillo Canela	28
Cuclillo Pico Amarillo	29
Cuervillo Cara Pelada	48
Cuervillo de Cañada	47
Curutié Blanco	95

D

Durmill	63
---------	----

E

Esparvero Variado	56
Espiguero Pardo	175

ÍNDICE DE NOMBRES COMUNES

F

Fiofío Oscuro	106
Fiofío Pico Corto	105
Frutero Yungueño	143
Fieguero	163

G

Garcita Blanca	45
Golondrina Barranquera	123
Golondrina Doméstica	125
Golondrina Negra	126
Golondrina Parda	124
Gorrión	137

H

Halcón Negro Chico	75
Hornero	92

J

Jilguero Dorado	167
Jote Cabeza Negra	52
Jote Cabeza Colorada	53
Jote Real	51
Juan Chiviro	118

ÍNDICE DE NOMBRES COMUNES

L

Loro Alísero	78
Loro Hablador	79
Loro Maitaca	77

M

Martín Pescador Grande	61
Milano Tijereta	55
Monterita Ceja Rojiza	174
Mosqueta Carasucia	102
Mosqueta Corona Gris	108
Mosqueta Pico Curvo	107

N

Naranjero	177
-----------	-----

P

Paloma Doméstica	22
Paloma Picazuró	23
Pava de Monte Yungueña	20
Pepitero de Collar	171
Pepitero Gris	170
Pícabuey	112
Pícaflor Cometa	36
Pícaflor Verde	37

ÍNDICE DE NOMBRES COMUNES

Picaflor Vientre Blanco	38
Pijuí Ceja Canela	97
Pijuí Frente Gris	96
Piojito Gargantilla	109
Piojito Silbón	104
Piojito Vientre Blanco	110
Pitíayumí	157

R

Ratona	128
Ratona Ceja Blanca	129
Reinamora Grande	165
Rey del Bosque	164

S

Saira de Antifáz	176
Suirirí Real	114

T

Taguató	57
Tangará Alisero	173
Tangará Cabeza Celeste	140
Tangará Garganta Negra	141
Tangará Gris	172
Tarefero	88
Tataupá Montaráz	18
Tero	42
Ticotico Estriado	94

ÍNDICE DE NOMBRES COMUNES

Tingazú	27
Tordo Músico	154
Tordo Pico Corto	152
Tordo Renegrado	153
Trepador Colorado	89
Trepador Gigante	90
Tucán Grande	65

U

Urraca Criolla	121
Urutaú	31

V

Vencejo de Collar	34
-------------------	----

Y

Yapú	149
Yerutí Gris	24
Yerutí Yungueña	25

Z

Zorzal Cabeza Negra	135
Zorzal Chalchalero	134
Zorzal Colorado	132
Zorzalito Boreal	131



Cerquero Yungueño (*Arremon dorbigni*)
Ph: Freddy Burgos

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

	Pág.
A	
<i>Accipiter bicolor</i>	56
<i>Agelaioides badius</i>	154
<i>Amazona aestiva</i>	79
<i>Amazona tucumana</i>	78
<i>Aramides cajaneus</i>	40
<i>Arremon dorbignii</i>	145
<i>Arremon torquatus</i>	144
<i>Asemospiza obscura</i>	175
<i>Atlapetes fulviceps</i>	147
B	
<i>Basileuterus culicivorus</i>	160
<i>Batara cinerea</i>	83
<i>Buteo brachyurus</i>	59
C	
<i>Cacicus chrysopterus</i>	150
<i>Campephilus leucopogon</i>	69
<i>Camptostoma obsoletum</i>	104
<i>Caracara plancus</i>	73
<i>Cathartes aura</i>	53
<i>Catharus ustulatus</i>	131
<i>Chlorophonia cyanocephala</i>	140
<i>Chlorospingus flavopectus</i>	141
<i>Chlorostilbon lucidus</i>	37
<i>Coccyzus americanus</i>	29

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

<i>Coccyzus melacoryphus</i>	28
<i>Colaptes melanochloros</i>	71
<i>Colaptes rubiginosus</i>	70
<i>Columba livia</i>	22
<i>Contopus fumigatus</i>	116
<i>Coragyps atratus</i>	52
<i>Cranioleuca pyrrhophia</i>	95
<i>Crypturellus tataupa</i>	18
<i>Cyanocorax chrysops</i>	121
<i>Cyanoloxia brissonii</i>	165
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	118

D

<i>Daptrius chimango</i>	74
<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	89
<i>Dryobates frontalis</i>	68

E

<i>Egretta thula</i>	45
<i>Elaenia obscura</i>	106
<i>Elaenia parvirostris</i>	105
<i>Elanoides forficatus</i>	55
<i>Elliotomyia chionogaster</i>	38
<i>Euphonia chlorotica</i>	141

F

<i>Falco ruficularis</i>	75
<i>Furnarius rufus</i>	92

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

G

<i>Geothlypis velata</i>	156
<i>Geranoaetus polyosoma</i>	58

I

<i>Icterus pyrrhopterus</i>	151
-----------------------------	-----

L

<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	92
<i>Leptotila megalura</i>	25
<i>Leptotila verreauxi</i>	24

M

<i>Machetornis rixosa</i>	112
<i>Mecocerculus leucophrys</i>	109
<i>Megaceryle torquata</i>	61
<i>Microspingus erythrophrys</i>	174
<i>Molothrus bonariensis</i>	153
<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	152
<i>Myiarchus tuberculifer</i>	115
<i>Myioborus brunniceps</i>	161
<i>Myiodynastes maculatus</i>	113
<i>Myiothlypis bivittata</i>	159
<i>Myiothlypis signata</i>	158

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

N

<i>Nyctibius griseus</i>	31
<i>Nystalus maculatus</i>	63

P

<i>Pachyramphus polychopterus</i>	99
<i>Pachyramphus validus</i>	100
<i>Passer domesticus</i>	137
<i>Patagioenas picazuro</i>	23
<i>Penelope bridgesi</i>	20
<i>Pheucticus aureoventris</i>	164
<i>Phimosus infuscatus</i>	48
<i>Phyllomyias burmeisteri</i>	107
<i>Phyllomyias sclateri</i>	108
<i>Phylloscartes ventralis</i>	102
<i>Piaya cayana</i>	27
<i>Picumnus cirratus</i>	67
<i>Pionus maximiliani</i>	77
<i>Pipraeidea melanonota</i>	176
<i>Piranga flava</i>	163
<i>Pitangus sulphuratus</i>	111
<i>Plegadis chihi</i>	47
<i>Progne chalybea</i>	125
<i>Progne elegans</i>	126
<i>Progne tapera</i>	124
<i>Psarocolius decumanus</i>	149
<i>Psittacara mitratus</i>	81
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	123
<i>Pyrrhomyias cinnamomeus</i>	103
<i>Pyrrhura molinae</i>	80

R

<i>Ramphastos toco</i>	65
<i>Rauenia bonariensis</i>	177
<i>Rupornis magnirostris</i>	57

S

<i>Saltator aurantirostris</i>	171
<i>Saltator coerulescens</i>	170
<i>Sappho sparganurus</i>	36
<i>Sarcoramphus papa</i>	51
<i>Serpophaga subcristata munda</i>	110
<i>Setophaga pitaiayumi</i>	157
<i>Sicalis flaveola</i>	167
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	88
<i>Spinus magellanicus</i>	139
<i>Sporophila caerulescens</i>	169
<i>Sporophila lineola</i>	168
<i>Streptoprocne zonaris</i>	34
<i>Synallaxis azarae</i>	97
<i>Synallaxis frontalis</i>	96
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	94
<i>Syrigma sibilatrix</i>	44

T

<i>Taraba major</i>	84
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	86
<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	85
<i>Theristicus caudatus</i>	49
<i>Thlypopsis ruficeps</i>	173

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

<i>Thlypopsis sordida</i>	172
<i>Thraupis sayaca</i>	178
<i>Troglodytes aedon</i>	128
<i>Troglodytes solstitialis</i>	129
<i>Turdus amaurochalinus</i>	134
<i>Turdus nigriceps</i>	135
<i>Turdus rufiventris</i>	132
<i>Tyrannus melancholicus</i>	114

V

<i>Vanellus chilensis</i>	42
<i>Vireo chivi</i>	119

X

<i>Xiphocolaptes major</i>	90
----------------------------	----

Z

<i>Zonotrichia capensis</i>	146
-----------------------------	-----




De izq. a der.: Yanina Romero, Rafael Portales, Sara Cabrera, Verónica Tejerina, Fabiana Sosa y Nuria Herrera.
Laguna El Huancar, Abra Pampa, Jujuy.



Fabiana S., Nuria H., Sara C. y Verónica T.



Verónica T. y Yanina R.



Nuria H., Yanina R. y Verónica T.

El Grupo Aves Jujuy nació en el año 2016, cuando un grupo de personas unidas por la misma pasión por las aves decidió reunirse para aprender más sobre ellas.

Consolidándonos así como un grupo de observadores independientes, que desde un inicio tuvo como objetivo no solo crecer personalmente desde los conocimientos de la ornitología, sino también poder trasladar esta información a la comunidad, y para lograrlo trabajamos sobre 3 ejes principales:

EDUCACIÓN AMBIENTAL. Dictar cursos y talleres de iniciación a la observación de aves, participar de diversos eventos donde logremos divulgar y compartir nuestro conocimiento, realizar charlas para distintas entidades educativas con el fin de acercar a las personas a este maravilloso mundo emplumado, dar a conocer la diversidad de aves que los rodean en su vida cotidiana para lograr un vínculo de más empatía hacia ellas.

INVESTIGACIÓN. A partir de este eje, el objetivo es conocer mejor la avifauna jujeña, su ecología y sus problemas de conservación, generando conocimiento que pueda ser publicado en el ámbito científico y, a su vez, hacerlo accesible a toda la comunidad, vinculando este eje con el anterior.

CONSERVACIÓN. Este punto en articulación con los dos anteriores nos permite, por un lado, aportar información que pueda ser útil para la conservación práctica de las aves, y, por otro lado, la educación ambiental nos permite descubrir "aliados" al generar un vínculo entre la comunidad y su avifauna, impulsando a que cada ciudadano las proteja.

Nos alegramos de que quieras abrirte al mundo de las aves y así compartir con nosotros, a través de esta publicación, el sentir, el amor y el compromiso por estos seres alados.

 www.instagram.com/grupoavesjujuy

 www.facebook.com/GrupoAvesJujuy

 grupoavesjujuy.contacto@gmail.com



De izq. a der.: Verónica Tejerina, Gabriela Domínguez, Nadia Tejerina, Sara Cabrera, Nuria Herrera, Rafael Portales y Yanina Romero. Q'MI RAYMI - Fiesta Verde - Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Parque Lineal Xibi Xibi, San Salvador de Jujuy.



Izq.: Nadia Tejerina.



Nuria Herrera.



Der.: Rafael Portales.

SOBRE LOS AUTORES



Venecia Nuria Herrera

Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, FCA-UNJU. Miembro fundador del Grupo Aves Jujuy, con 9 años de trayectoria y diversas participaciones en eventos dentro y fuera de la provincia, como asistente, organizadora y disertante dentro del ámbito de la Ornitología. Miembro del Equipo de Comunicación de eBird Argentina. Co-autora del libro Aves de Argentina: Tesoro Natural. Homenaje a Tito Narosky. Guía de observadores de aves en la Reserva Natural Privada Aldea Luna. Directora de Proyecto de la Fundación Bosque Nativo.



Sara Noemí Cabrera

Lic. en Cs. Biológicas, egresada de la FCA-UNJU. Con 7 años de experiencia en la ornitología. Docente de la UNJU en la cátedra de Diversidad Biológica III en la carrera de Lic. en Cs. Biológicas y en la UCSE-DASS en las cátedras de Estadística y Metodología de la Investigación en carrera de Kinesiología. Miembro del equipo científico de la Fundación Bosque Nativo. Miembro fundador del Grupo Aves Jujuy. Guía de observación de aves en la Reserva Natural Privada Aldea Luna. Fotógrafa de naturaleza aficionada.



María Verónica Tejerina

Diseñadora de Interiores y Equipamiento, recibida en la Universidad Nacional de Tucumán. Social Manager en el Parque Botánico Municipal "Barón Carlos María Schuel", Observadora y fotógrafa de aves, integrante del Grupo Aves Jujuy desde el año 2020.



Nadia Alejandra Tejerina

Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy. Miembro fundador del Grupo Aves Jujuy. Integra el Equipo de Comunicación de eBird Argentina. Ayudante de segunda en la cátedra de Introducción a la Biología en la FCA-UNJU. Aficionada a la fotografía de naturaleza. Actualmente se encuentra desarrollando tareas de investigación en el campo de la Entomología en el Instituto de Biología de la Altura (INBIAL).



Gloria Alejandra Yanina Romero

Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy. Miembro fundador del Grupo Aves Jujuy.



Héctor Rafael Portales

Estudiante de la Tecnicatura "Guía de Turismo Comunitario", con más de 10 años de experiencia en la observación de aves y en senderismo de montaña y campo travesía. Miembro fundador del Grupo Aves Jujuy.

**AUTORIDADES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY**

RECTOR

Mg. Ing. Agr. Mario César Bonillo

VICERRECTORA

Dra. Liliana del Carmen Bergesio

SECRETARIO GENERAL

E.S. Edgardo Aramayo

SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

Abog. César Guillermo Farfán

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

E.S. Edgardo Aramayo (a cargo)

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADÉMICOS

Dra. Esp. Lic. María Eugenia Bernal

SECRETARIA DE CIENCIA Y TÉCNICA Y ESTUDIOS REGIONALES

Mg. Sandra Adriana Giunta

SECRETARIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Prof. Ariel Horacio Díaz

SECRETARIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Brom. Ramón Fernando Torrejón

COORDINADOR DE EDIUNJU

Dr. Marcelo Fernando Sadir

AUTORIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY

MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY
INTENDENTE
Arq. Raúl Eduardo Jorge

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y AMBIENTE
SECRETARIA
Arq. Adriana P. Díaz

DIRECCIÓN GENERAL DE AMBIENTE
DIRECTORA GENERAL
Arq. María Silvina González Diez

PARQUE BOTÁNICO MUNICIPAL “BARÓN CARLOS MARÍA SCHUEL”
COORDINADORA
M.P.N. Marcela Gaspar

**AUTORIDADES DE LA
FUNDACIÓN BOSQUE NATIVO**

PRESIDENTE
Martín Baldoni

SECRETARIA
Elizabeth Amar

TESORERO
Matías Baldoni Amar



Editorial de la
Universidad
Nacional
de Jujuy



ISBN 978-950-721-619-0



9 789507 216190



Grupo Aves Jujuy



MUNICIPALIDAD DE
SAN SALVADOR
DE JUJUY



Fundación
Bosque
Nativo